



FICHA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO TC

etiqueta

- ¿Le han realizado estudios con contraste? SI NO
¿Tuvo alguna reacción a contraste? SI NO
¿Tiene alergias a medicamentos, alimentos u otras sustancias? ¿Cuáles? _____ SI NO
¿Padece alguna enfermedad del corazón, asma o insuficiencia renal? ¿Cuáles? _____ SI NO
En caso de mujeres, ¿posibilidad de estar embarazada? _____ SI NO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

La TC es por criterio médico, la mejor prueba para estudiar su problema de salud; existen otras exploraciones radiológicas, endoscopias o exploraciones quirúrgicas que pueden proporcionar información sobre su enfermedad, pero se considera que la información más precisa la dará esta exploración. Esta técnica, está destinada a observar las estructuras anatómicas de cualquier parte del cuerpo mediante el uso de rayos X. En ocasiones es imprescindible la administración de contraste yodado oral y/o intravenoso.

RIESGOS Y COMPLICACIONES

Irradiación: Esta técnica utiliza radiaciones ionizantes, por lo que conlleva un riesgo de superar los valores de dosis umbral de radiación, y puede producir efectos deterministas atribuibles a la exposición a la radiación. No está indicada en embarazadas salvo excepciones. En la población infantil, se realiza solo cuando hay una indicación precisa.

Reacciones adversas al contraste yodado: El contraste yodado es un producto de probada eficacia y buena tolerancia. Durante su administración puede notar sensaciones como calor generalizado (particularmente en cara y genitales), sabor metálico, cosquilleo en nariz y garganta, deseo de orinar, náuseas y vómitos. Otras complicaciones son:

-**Extravasación:** la vena se puede romper durante la inyección, con acumulación de contraste fuera de la vena. No es peligroso y generalmente se soluciona en dos o tres días de tratamiento médico.

-**Reacciones leves:** náuseas, vómitos, picores o manchas en la piel. No requieren medicación o se corrigen fácilmente con medicación. En casos más graves, hinchazón de párpados y labios que pueden durar varias horas.

-Excepcionalmente, **reacciones muy graves** (dificultad respiratoria que puede requerir intubación para asegurar normal respiración, alteraciones circulatorias, pérdida de conciencia, convulsiones). Se dan solo en 1 de cada 2.500 pacientes y requieren tratamiento. Excepcionalmente (1 de cada 150.000 pacientes), se puede producir la muerte.

Si se produce alguna complicación, este Servicio dispone de personal y medios para atenderle en todo momento. No hay prueba que permita conocer de antemano que personas pueden sufrir una reacción adversa ni de que intensidad.

Si después de leer detenidamente este consentimiento necesita aclarar alguna duda o mayor información, no dude en solicitarlo *al médico radiólogo responsable de su exploración o al personal que le atiende en nuestro centro.*

Declaro que he comprendido el contenido de la información que he leído y se me explica, y de la adicional que solicito, así como de los riesgos que de la exploración se pueda derivar, incluso de aquellos que, aunque infrecuentes, tienen consideración clínica de muy graves. En cualquier momento puedo revocar este consentimiento sin dar explicación.

DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE ME REALICE LA TAC SI NO
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE SE ME ADMINISTRE CONTRASTE EN CASO NECESARIO SI NO

PACIENTE, FAMILIAR O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

DNI:

Firma:

A cumplimentar por personal del CEDIV, datos clínicos o comentarios:

MEDICO RESPONSABLE

Nombre:

Nº Colegiado:

Firma:

URGENTE 24HS

2-6 DIAS (Vendrá a buscar la prueba el día (/ /)

1 SEMANA